


Câu 1: Thể tích của khối hộp chữ nhật có kích thước ba cạnh lần lượt là 3, 4, 5 bằng

- A. 20π . B. 60. C. 60π . D. 20.

Câu 2: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình sau:



Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

- A. $a > 0, b < 0, c > 0, d < 0$. B. $a > 0, b > 0, c < 0, d > 0$.
C. $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$. D. $a < 0, b < 0, c < 0, d > 0$.

Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{x+1}{4^x}$.

- A. $y' = \frac{1 - (x+1)\ln 2}{2^{2x}}$. B. $y' = \frac{1 - 2(x+1)\ln 2}{2^x}$.
C. $y' = \frac{1 - 2(x+1)\ln 4}{2^x}$. D. $y' = \frac{1 - 2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$.

Câu 4: Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 4$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

- A. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(1; +\infty)$.
B. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABC$. Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A', B', C' khác với S . Khi đó tỉ số $\frac{V_{S.A'B'C'}}{V_{S.ABC}}$ bằng

- A. $\frac{SA}{SA'} \cdot \frac{SB}{SB'} \cdot \frac{SC}{SC'}$. B. $\frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SB'}{SB} \cdot \frac{SC'}{SC}$. C. $\frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SB'}{SB}$. D. $\frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SC'}{SC}$.


Câu 6: Một khối chóp có diện tích đáy bằng 24. Một cạnh bên có chiều dài bằng 4 và tạo với mặt đáy góc 60° . Thể tích của khối chóp đó bằng

- A. $16\sqrt{3}$. B. $48\sqrt{3}$. C. 16. D. $32\sqrt{3}$.

Câu 7: Tập xác định của hàm số $y = \log(2x - x^2)$ là

- A. $D = (-1; 1)$. B. $D = (-\infty; 0)$. C. $D = (2; +\infty)$. D. $D = (0; 2)$.

Câu 8: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình sau?



- A. $y = x^4 - 3x^2 + 1$. B. $y = -x^3 + x^2 + 1$. C. $y = x^4 + x^2 - 1$. D. $y = -x^4 + 3x^2 - 1$.

Câu 9: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ là **đúng**?

- A. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.
 B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.
 C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
 D. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{2-x-x^2}$ là

- A. 0. B. $\frac{3}{2}$. C. $-\frac{1}{2}$. D. $\frac{9}{4}$.


Câu 11: Cho a là một số thực dương, biểu thức $a^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{a^5}}$ viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

- A. $a^{\frac{7}{6}}$. B. $a^{\frac{19}{6}}$. C. a^2 . D. $a^{\frac{11}{6}}$.


Câu 12: Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{2x-2}$ có tiệm cận đứng là

- A. $y=1$. B. $y=-1$. C. $x=1$. D. $x=-1$.

Câu 13: Biết rằng hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ có đồ thị như Hình 1.



Hình 1



Hình 2

Đồ thị như Hình 2 là của hàm số nào dưới đây?

- A. $y = |x^3 - 6x^2 + 9x|$. B. $y = |x|^3 - 6x^2 + 9|x|$.
 C. $y = -x^3 + 6x^2 - 9x$. D. $y = |x|^3 + 6|x|^2 + 9|x|$.

Câu 14: Gọi l và r lần lượt là độ dài đường sinh và bán kính đáy của hình nón (N). Diện tích xung quanh của (N) được tính bởi công thức nào dưới đây?

- A. $S_{xq} = \pi rl$. B. $S_{xq} = 3\pi rl$. C. $S_{xq} = 2\pi rl$. D. $S_{xq} = 4\pi rl$.

Câu 15: Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2023}{x+2024}$ là

- A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.

Câu 16: Một đường tròn khi quay quanh một đường kính của nó thì tạo thành

- A. Mặt nón. B. Mặt trụ. C. Mặt cầu. D. Khối cầu.

Câu 17: Tập xác định của hàm số $y = (x - 5)^\pi$ là

- A. $D = \mathbb{R}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{5\}$. C. $D = [5; +\infty)$. D. $D = (5; +\infty)$.

Câu 18: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	2	3	4	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(3; +\infty)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(-1; 2)$. D. $(2; 3)$.

Câu 19: Một khối chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h thì có thể tích được tính theo công thức

- A. $V = Bh$. B. $V = \frac{1}{3}\pi Bh$. C. $V = \pi Bh$. D. $V = \frac{1}{3}Bh$.

Câu 20: Cho mặt cầu $S(O; r)$ và mặt phẳng (P) . Biết khoảng cách từ O đến (P) bằng $\frac{r}{2}$. Khi đó thiết diện tạo bởi mặt phẳng (P) với $S(O; r)$ là một đường tròn có đường kính bằng

- A. r . B. $r\sqrt{3}$. C. $\frac{r\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{r}{2}$.

Câu 21: Thể tích của một khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng $\frac{3}{2}$ là

- A. $V = \frac{1}{3}$. B. $V = 9$. C. $V = 3$. D. $V = 6$.

Câu 22: Mặt phẳng đi qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh bằng a . Thể tích khối trụ bằng

- A. $\frac{\pi a^3}{3}$. B. $\frac{\pi a^3}{12}$. C. πa^3 . D. $\frac{\pi a^3}{4}$.

Câu 23: Tập nghiệm của bất phương trình $3^x \leq 8$ là

- A. $S = (-\infty; \log_3 3]$. B. $S = (-\infty; \log_3 8]$. C. $S = [\log_3 3; +\infty)$. D. $S = [\log_3 8; +\infty)$.

Câu 24: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	3

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 25: Cho a là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\log_3 a = \log_a 3$. B. $\log_3 a = \frac{1}{\log_a 3}$. C. $\log_3 a = -\log_a 3$. D. $\log_3 a = \frac{1}{\log_3 a}$.

Câu 26: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'		$+$	0	$-$	0	$-$
y			5		5	
	$-\infty$			2		$-\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 2. B. 0. C. ± 1 . D. 5.

Câu 27: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}} x > 3$ là

- A. $S = \left(-\infty; \frac{1}{8}\right)$. B. $S = (8; +\infty)$. C. $S = \left(\frac{1}{8}; +\infty\right)$. D. $S = \left(0; \frac{1}{8}\right)$.

Câu 28: Thể tích của khối đa diện đều loại $\{3, 3\}$ có cạnh bằng 2 là

- A. $V = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. B. $V = 8$. C. $V = 2(15 + 7\sqrt{5})$. D. $V = \frac{8\sqrt{2}}{3}$.

Câu 29: Phương trình $\log_2(3x+2) = 2$ có nghiệm là

- A. $x = 1$. B. $x = \frac{2}{3}$. C. $x = 2$. D. $x = \frac{4}{3}$.

Câu 30: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-1; 3]$ và có bảng biến thiên như sau:

x	-1	2	3
y'	-	0	+
y	2	-2	5

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 3]$ bằng

- A. 5. B. 2. C. -1. D. -2.

Câu 31: Xét α, β là hai số thực bất kì. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

- A. $\left(\frac{2}{3}\right)^\alpha > \left(\frac{2}{3}\right)^\beta \Leftrightarrow \alpha < \beta$. B. $\left(\frac{2}{3}\right)^\alpha < \left(\frac{2}{3}\right)^\beta \Leftrightarrow \alpha = \beta$.
C. $\left(\frac{2}{3}\right)^\alpha > \left(\frac{2}{3}\right)^\beta \Leftrightarrow \alpha > \beta$. D. $\left(\frac{2}{3}\right)^\alpha > \left(\frac{2}{3}\right)^\beta \Leftrightarrow \alpha = \beta$.

Câu 32: Phương trình $2^{x+2} = 16$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{1}{2}$. B. $x = 0$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Câu 33: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và có đạo hàm $f'(x) = \frac{x^2 - 9}{2x^2}, \forall x \neq 0$. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = -3$. B. $x = 3$. C. $(-3; 0)$. D. $(3; 0)$.

Câu 34: Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như trong hình sau?

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	-		-
y	1	$-\infty$	1

- A. $y = \frac{x+1}{x-1}$. B. $y = \frac{x-2}{x-1}$. C. $y = \frac{x+1}{1-2x}$. D. $y = \frac{x+1}{1-x}$.

Câu 35: Khối lập phương cạnh a có thể tích bằng

- A. $3a^3$. B. $\frac{a^3}{3}$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. a^3 .

Câu 36: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A , SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 3. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $\sin\alpha$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

Câu 37: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon sữa bò là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Muốn thể tích khối trụ bằng V và diện tích toàn phần hình trụ nhỏ nhất thì bán kính đáy R bằng bao nhiêu?

- A. $R = \sqrt{\frac{V}{2\pi}}$. B. $R = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$. C. $R = \sqrt{\frac{V}{\pi}}$. D. $R = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$.

Câu 38: Cho khối lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác ABC cân với $AB = AC = a$, $\angle BAC = 120^\circ$, mặt phẳng $(AB'C')$ tạo với mặt đáy một góc 60° . Thể tích khối chóp $A'.BCC'B'$ bằng

- A. $\frac{a^3}{2}$. B. $\frac{a^3}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a^3}{4\sqrt{3}}$.


Câu 39: Cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = 3a$, $AC = 4a$, gọi M là trung điểm của AC . Khi quay quanh AB , các đường gấp khúc AMB , ACB tạo thành các hình nón có diện tích xung quanh lần lượt là S_1, S_2 . Tỷ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{13}}{10}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$. C. $\frac{\sqrt{11}}{4}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 40: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $25^x - 3.5^x + m + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt?

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 41: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm đến cấp hai trên $\mathbb{R}$ và $f(0) = 0, f''(x) > -\frac{1}{6}, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Hàm số $g(x) = |f(x^2) - 2024x|$ có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 42: Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(2m-1)x + 1$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên tập xác định.

- A. $m = 1$. B. $m \in \emptyset$. C. $-1 \leq m \leq 1$. D. $\forall m \in \mathbb{R}$.

Câu 43: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

x	$-\infty$	-4	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$		1		$+\infty$
		-2		-4	

Số nghiệm của phương trình $f(f(x)) = -2$ là

- A. 7. B. 4. C. 5. D. 9.

Câu 44: Cho phương trình $x^3 - 3x^2 + 3m - 1 = 0$. Với giá trị nào của m thì phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt?

- A. $-\frac{5}{3} < m < -\frac{1}{3}$. B. $1 < m < 3$. C. $\frac{1}{3} < m < \frac{5}{3}$. D. $1 < m < 5$.

Câu 45: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x^2 + 6x + 8) + \log_{\frac{1}{3}}(x + 2) < \frac{1}{2} \log_{\sqrt{3}} 7$ là $S = (a; b)$, với

$a, b \in \mathbb{Q}$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.

- A. $P = 20$. B. $P = 125$. C. $P = 10$. D. $P = 13$.

Câu 46: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 3 và thể tích bằng 9. Tính độ dài cạnh bên của hình chóp đã cho.

- A. $\frac{3\sqrt{6}}{2}$. B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{3\sqrt{3}}{3}$. D. 3.

Câu 47: Cho $a > 0, b > 0$ thỏa mãn: $\log_{4a+5b+1}(16a^2 + b^2 + 1) + \log_{8ab+1}(4a + 5b + 1) = 2$. Giá trị của $4a + b$ bằng

- A. $\frac{20}{3}$. B. $\frac{27}{4}$. C. 6. D. 9.

Câu 48: Đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + c$ có hai điểm cực trị là $A(0; 1)$ và $B(-1; 2)$. Khi đó giá trị của $a + b + c$ bằng

- A. 0. B. 6. C. 4. D. 2.

Câu 49: Hàm số $y = \ln(x^2 - 2mx + 4)$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$ khi các giá trị của tham số m là

- A. $-2 < m < 2$. B. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$. C. $m < 2$. D. $m = 2$.

Câu 50: Phương trình $\log_2(5 - 2^x) = 2 - x$ có hai nghiệm là x_1, x_2 . Tính $P = x_1 + x_2 + x_1 x_2$.

- A. $P = 3$. B. $P = 11$. C. $P = 2$. D. $P = 9$.

----- HẾT -----